

# **ERFANDEL**® (erdafitinibe)

Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.

comprimidos revestidos

3 mg, 4 mg ou 5 mg



# IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

**Erfandel®** 

Comprimidos Revestidos

erdafitinibe

# **APRESENTAÇÕES**

Comprimidos revestidos com 3 mg de erdafitinibe em 2 blisters com 28 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 3 mg de erdafitinibe em 2 blisters com 42 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 4 mg de erdafitinibe em 1 blister com 28 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 4 mg de erdafitinibe em 2 blister com 28 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 5 mg de erdafítinibe em 1 blister com 28 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 3 mg de erdafítinibe em 1 frasco com 56 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 3 mg de erdafitinibe em 1 frasco com 84 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 4 mg de erdafitinibe em 1 frasco com 28 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 4 mg de erdafitinibe em 1 frasco com 56 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 5 mg de erdafitinibe em 1 frasco com 28 comprimidos.

**USO ORAL** 

# **USO ADULTO**

# **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido revestido contém 3, 4 ou 5 mg de erdafitinibe.

Excipientes: manitol, celulose microcristalina, meglumina, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, álcool polivinílico, dióxido de titânio, talco, monocaprilocaprato de glicerila, laurilsulfato de sódio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho (apenas para comprimidos laranja e marrom), óxido de ferro preto (apenas para comprimido



marrom).

# INFORMAÇÕES AO PACIENTE

# 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

**ERFANDEL**® é indicado para o tratamento de pessoas com carcinoma urotelial (câncer de bexiga e do trato urinário) que:

- Tenham uma certa anomalia no gene do receptor do fator de crescimento de fibroblastos (FGFR), e
- Tenham um câncer que se espalhou, apesar de terem tentado pelo menos um outro medicamento quimioterápico nos últimos 12 meses.

O ERFANDEL® deve ser usado apenas para tratar o câncer da bexiga e do trato urinário com a alteração do gene FGFR. Por isso, antes de iniciar o tratamento, o seu profissional de saúde irá testar esta alteração para se certificar de que este medicamento é adequado para você.

O ERFANDEL® é utilizado em adultos (18 anos ou mais). Não se sabe se o ERFANDEL® é seguro e eficaz em crianças.

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**ERFANDEL**® é um inibidor altamente seletivo e potente com alta afinidade por tirosina quinase de todos os membros da família de receptores de fatores de crescimento de fibroblastos (FGFR), 1, 2, 3 e 4.

# 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**ERFANDEL**® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao produto ou qualquer um dos componentes de sua fórmula.

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Fale com seu médico antes de usar ERFANDEL®.

O seu médico deve acompanha-lo com atenção especial nos seguintes casos:

Problemas oculares (visão)



Informe o seu médico imediatamente se sentir quaisquer problemas visuais ou oculares durante o tratamento com **ERFANDEL**<sup>®</sup>. Seu médico passará orientações sobre exames de visão antes e durante o seu tratamento com **ERFANDEL**<sup>®</sup>. Seu médico poderá pedir que pare de tomar **ERFANDEL**<sup>®</sup> ou encaminhá-lo a um especialista se você desenvolver sintomas e sinais que possam afetar sua visão.

#### Crianças e adolescentes

Não administre **ERFANDEL**<sup>®</sup> a crianças ou adolescentes com menos de 18 anos de idade. Isto é porque não se sabe como o medicamento irá afetá-los.

#### Gravidez, contracepção e amamentação

ERFANDEL® pode prejudicar o seu feto. Você não deve engravidar durante o tratamento com ERFANDEL® e por 1 mês após a última dose de ERFANDEL®. Informe seu médico imediatamente se engravidar. Se você estiver grávida, acha que está grávida ou planeja engravidar, consulte o seu médico antes de utilizar ERFANDEL®. O seu médico irá te orientar a realizar um teste de gravidez antes de iniciar o tratamento com ERFANDEL®.

As mulheres que podem engravidar devem utilizar um contraceptivo altamente eficaz antes e durante o tratamento e durante 1 mês após a última dose de ERFANDEL®.

Pacientes do sexo masculino devem usar contracepção efetiva (preservativo) quando sexualmente ativos e não devem doar ou armazenar sêmen durante o tratamento e por 1 mês após a última dose de **ERFANDEL**<sup>®</sup>.

Você não deve tomar este medicamento se estiver amamentando ou planejando amamentar. Não amamente durante o tratamento com ERFANDEL® e durante 1 mês após a última dose de ERFANDEL®.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista.

Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano: O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.

#### Capacidade de dirigir e operar máquinas

Problemas oculares em pacientes tomando **ERFANDEL**<sup>®</sup> foram reportados e isto deve ser levado em consideração ao conduzir ou utilizar máquinas. Se você tiver sintomas que afetem sua visão, não conduza ou use máquinas até que o efeito desapareça.

#### Interação medicamentosa

janssen 🔭

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma, incluindo medicamentos sujeitos a prescrição médica e de venda livre, e fitoterápicos. Tomar ERFANDEL® com alguns medicamentos pode afetar o funcionamento de ERFANDEL® e causar efeitos secundários.

Efeito de outros medicamentos em ERFANDEL®

Se **ERFANDEL**<sup>®</sup> for administrado concomitantemente com um inibidor moderado de CYP2C9 (por exemplo, fluconazol) ou potente de CYP3A4, seu médico irá avaliar uma possível redução de dose de **ERFANDEL**<sup>®</sup>. Se o inibidor moderado de CYP2C9 ou potente de CYP3A4 for descontinuado, seu médico irá reavaliar a dose de **ERFANDEL**<sup>®</sup>.

Se **ERFANDEL**<sup>®</sup> for administrado concomitantemente com um indutor potente de CYP3A4 e fraco de CYP2C9 (por exemplo, carbamazepina), seu médico irá avaliar uma possível elevação da dose de **ERFANDEL**<sup>®</sup>. Se o indutor potente for descontinuado, seu médico irá reavaliar a dose de **ERFANDEL**<sup>®</sup>.

Não se espera que agentes redutores de ácidos (por exemplo, antiácidos, antagonistas de H<sub>2</sub>, ou inibidores de bomba de próton) ou inibidores de P-glicoproteína afetem a ação de **ERFANDEL**<sup>®</sup>.

Efeito de ERFANDEL® em outros medicamentos

A administração de **ERFANDEL**® com substratos de P-glicoproteína (P-gp) pode aumentar sua exposição sistêmica se administrado concomitantemente. Os substratos de P-gp orais com faixa terapêutica estreita, como digoxina, devem ser administrados pelo menos 6 horas antes ou depois de erdafitinibe para minimizar o potencial para interações.

**ERFANDEL**® não é um inibidor de isoenzimas principais de CYP (por exemplo, midazolam) e de outros transportadores (por exemplo metformina). Não se espera que as interações medicamentosas sejam relevantes.

Excipientes com efeito conhecido

Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho (apenas para comprimidos laranja e marrom), óxido de ferro preto (apenas para comprimido marrom).

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

**ERFANDEL**<sup>®</sup> deve ser armazenado em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).

Apresentação em frasco: Após aberto, válido por 2 meses.

Aspecto físico

4



Comprimidos de 3 mg: Amarelos, de formato redondo biconvexo, revestidos por película, gravados com "3" em um lado; e "EF" no outro lado.

Comprimidos de 4 mg: Laranjas, de formato redondo biconvexo, revestidos por película, gravados com "4" em um lado; e "EF" no outro lado.

Comprimidos de 5 mg: Marrons, de formato redondo biconvexo, revestidos por película, gravados com "5" em um lado; e "EF" no outro lado

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma alteração no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se você pode usá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

#### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Seu médico irá prescrever a dose e o horário de **ERFANDEL**<sup>®</sup>. A dose inicial recomendada é de 8 mg (2 comprimidos de 4 mg) uma vez por dia, por via oral. Após cerca de 2 semanas de tratamento com **ERFANDEL**<sup>®</sup>, o seu médico poderá fazer um exame de sangue para determinar o nível de fosfato no seu sangue. Com o resultado do exame de sangue, seu médico poderá aumentar sua dose para 9 mg por dia. Seu médico poderá diminuir a dose diária de **ERFANDEL**<sup>®</sup> se você apresentar certas reações adversas.

Tome ERFANDEL® uma vez por dia.

Engula os comprimidos inteiros de ERFANDEL® com ou sem alimentos.

Tente tomá-lo na mesma hora todos os dias. Isso ajudará você a lembrar de tomá-lo.

Se vomitar, não tome outro comprimido. Tome sua dose regular no dia seguinte.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

#### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?



Se você esquecer de uma dose, tome a dose esquecida o mais rápido possível no mesmo dia. Tome sua dose regular de ERFANDEL® no dia seguinte. Comprimidos extras não devem ser tomados para compensar a dose esquecida.

Não pare de tomar este medicamento a menos que seu médico te oriente. Se ainda tiver dúvidas sobre a utilização deste medicamento, pergunte a um profissional da saúde.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

# 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos adversos, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Informe o seu médico se notar algum dos seguintes efeitos adversos.

Sistema de Classe e Órgãos do								
MedDRA	Reações medicamentosa adversa	Frequência						
Metabolismo e distúrbios de	Hiperfosfatemia (aumento do fosfato no sangue)	Muito comum						
nutrição	Apetite reduzido	Muito comum						
	Baixo nível de sódio no sangue	Muito comum						
Distúrbios gastrointestinais	Estomatite (feridas na boca)	Muito comum						
	Diarreia	Muito comum						
	Boca seca	Muito comum						
Distúrbios cutâneos e do tecido	Pele seca	Muito comum						
subcutâneo	Alopecia (perda de cabelo)	Muito comum						
	Síndrome de eritrodisestesia palmar-plantar (vermelhidão,	Muito comum						
	inchaço, descamação ou sensibilidade, principalmente nas							
	mãos ou pés)							
	Onicólise (descolamento da unha)	Muito comum						
	Paroníquia (pele infectada ao redor da unha)	Muito comum						
	Distrofia ungueal (deformação das unhas)	Muito comum						
	Descoloração ungueal (unhas descoloridas)	Muito comum						
	Distúrbio ungueal (problemas nas unhas)	Comum						
	Onicomadese (base das unhas separada do leito ungueal)	Comum						
	Onicalgia (dor nas unhas)	Comum						
	Prurido (coceira)	Comum						
	Fissuras cutâneas (rachadura na pele)	Comum						



	Linhas de beau (múltiplas linhas transversais)	Comum				
	<u> </u>					
	Onicoclasia (quebra das unhas)	Comum				
	Eczema (erupção cutânea com comichão)	Comum				
	Hiperceratose (pele espessa)	Comum				
	Esfoliação cutânea (pele escamosa)	Comum				
	Lesão cutânea (aparência anormal da pele)	Comum				
Distúrbios oculares	Olho seco					
	Conjuntivite (olhos inflamados)	Muito comum				
	Coriorretinopatia (acúmulo de líquido sob a retina, o que	Comum				
	pode levar à visão embaçada)					
	Descolamento de epitélio pigmentado da retina (a retina se	Comum				
	separa das camadas de células internas, o que pode levar à					
	visão turva)					
	Ceratite (córnea inflamada na parte frontal do olho)	Comum				
	Descolamento de retina (retina se separa da parte posterior	Comum				
	do olho, o que pode levar à perda de visão)					
	Edema de retina (inchaço da retina)	Comum				
	Xeroftalmia (olhos secos)	Comum				
	Retinopatia (doença da retina)	Comum				
	Ceratite ulcerativa (úlceras na córnea - parte frontal do	Comum				
	olho)					
	Descolamento vítreo (a mácula - centro da retina - separa	Comum				
	das camadas de células internas o que pode acarretar visão					
	embaçada)					
Distúrbios do sistema nervoso	Disgeusia (mudança no sentido do sabor)	Muito comum				
Investigações	Perda de peso	Muito comum				
	Aumento do nível de "creatinina" no sangue	Muito comum				
Distúrbios respiratórios,	Secura nasal	Comum				
torácicos e mediastinais	Sagramento nasal	Comum				
	Diminuição súbita da função renal	Comum				
Distúrbios gerais e condições	Secura na mucosa	Comum				
do local de administração						

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista.

janssen

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE 9.

**MEDICAMENTO?** 

Se você tomar ERFANDEL® em excesso, ligue para seu médico ou dirija-se imediatamente à sala de emergência do

hospital mais próximo.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a

embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais

orientações.

Esse medicamento foi registrado por meio de um procedimento especial, conforme previsão da Resolução RDC

nº 205, de 28 de dezembro de 2017, considerando a raridade e gravidade da doença para a qual está indicado.

Novas informações ainda serão apresentadas à Anvisa e poderão gerar alterações nesta bula ou mesmo na

condição do registro do medicamento.

**DIZERES LEGAIS** 

Registro - 1.1236.3433

Farm Resp: Erika Diago Rufino – CRF/SP nº 57310

Registrado por:

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 – São Paulo – SP - CNPJ 51.780.468/0001-87

Produzido por:

Janssen-Cilag S.P.A. - Latina - Itália

Importado por:

Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. - São José dos Campos, Brasil

8





® Marca Registrada

# VENDA SOB PRESCRIÇÃO.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 08/10/2025.



CCDS 2407

VP TV 14.0

						HISTÓRICO DE BULAS				Johnson & Johnson Innovative Medicine
		Dados	da submissão eletrônica			Dados da petição que altera bula	1		Dados das	alterações de bulas
Produto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
Erfandel (erdafitinibe)	30/09/2019	2296123/19-2	Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	28/12/2018	1215302/18-8	11306 - MEDICAMENTO NOVO - Registro de Medicamento Novo	30/9/2019	Inclusão Inicial	VP01/VPS01	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
Erfandel (erdafitinibe)	04/02/2021	0469625/21-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12		0469625/21-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12	02/04/2021	VP: 4 VPS: 6, 9	VPTV2.0/VPSTV2.	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
Erfandel (erdafitinibe)	08/06/2021	2216626/21-0	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12		2984048/20-1	11107 - RDC 73/2016 - NOVO - Ampliação do prazo de validade do medicamento	15/3/2021	VP: - VPS: 7	VPTV3.0/VPSTV3.	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
Erfandel (erdafitinibe)	) 16/06/2021	2328810/21-7	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12		2328810/21-7	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12	16/6/2021	VP: 8 VPS: 9	VPTV4.0/VPSTV4.	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
Erfandel (erdafitinibe)	) 06/12/2021	4816690/21-2	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12		4800592/21-4	11104 - RDC 73/2016 - NOVO - Redução do prazo de validade do medicamento	12/06/2021	VP: - VPS: 7	VPTV5.0/VPSTV5.	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
Erfandel (erdafitinibe)	) 19/08/2022	4578236/22-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12		4578236/22-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12	19/08/2022	VP: 8 VPS: 9	VPTV6.0/VPSTV6. 0	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
Erfandel (erdafitinibe)	) 25/08/2023	0901999/23-7	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12		0901999/23-7	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12	25/08/2023	VP: 8 VPS: 9	VPTV7.0/VPSTV7. 0	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
Erfandel (erdafitinibe)	) 20/09/2023	1002498/23-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12		0085947/23-8	11062 – RDC 73/2016 – NOVO – Inclusão de novo tipo de embalagem primária do medicamento	28/08/2023	VP: Apresentações VPS: Apresentações	VPTV8.0/VPSTV8.	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 84 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28
Erfandel (erdafitinibe)	) 20/09/2023	1002498/23-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12		0085949/23-4	11107 – RDC 73/2016 – NOVO - Ampliação do prazo de validade do medicamento	28/08/2023	VP: - VPS: 7	VPTV8.0/VPSTV8.	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 84 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28

Erfandel (erdafitinibe) 10/10/2023 1081760	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação d 23-1 Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12	5220481/21-2	11315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos - GESEF	11/09/2023	VP: - VPS: 3, 6 e 8	VPTV9.0/VPSTV9.	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 84 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28
Erfandel (erdafitinibe) 04/12/2023 1370006	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação d 23-3 Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulári RDC 60/12	0638424/23-2	11315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos - GESEF	14/11/2023	VP: 4 VPS: 6 e 9	VPTV10/VPSTV10	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 84 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28
Erfandel (erdafitinibe) 04/12/2023 1370006	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação d 23-3 Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulári RDC 60/12	4577300/22-2	11315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos - GESEF	14/11/2023	VP: 4 VPS: 6 e 9	VPTV10/VPSTV10	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 84 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28
Erfandel (erdafitinibe) 11/07/2024 0944737	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação d 24-2 Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulári RDC 60/12	0944737/24-2	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12	11/07/2024	VP: Identificação do Medicamento, 4, 5, Dizeres Legais. VPS: Identificação do Medicamento, 5, 7, Dizeres Legais.	VPTV11/VPSTV11	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 84 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28
Erfandel (erdafitinibe) 23/04/2025 0543556	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação d 25-5 Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12	1351219/24-6	11107 - RDC 73/2016 - NOVO - Ampliação do prazo de validade do medicamento	04/07/2025	VPS: 7	VPTV12/VPSTV12	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 84 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28
Erfandel (erdafitinibe) 05/08/2025 1006140	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação d 25-5 Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulári RDC 60/12	1203767/24-2	11315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos - GESEF	11/07/2025	VPS: 5 e 6 VP: 4	VPTV13/VPSTV13	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 84 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28

Erfandel (erdafitinibe)	08/10/2025	xxxxxx/xx-x	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12	xxxxxxx/xx-x	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula — publicação no Bulário RDC 60/12	08/10/2025	VPS: 5 VP: 4	VPTV14/VPSTV14	3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 42 4 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 4 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 28 5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 3 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 84 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28 4 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 28
-------------------------	------------	-------------	--	--------------	---	------------	-----------------	----------------	--